

PROTEGE SU VIDA



Manual de cuidados del Rottweiler

Crecimiento, salud, conducta y responsabilidad legal. Guía completa
para las familias que reciben un cachorro de Rutherford Haus.

RUTHERFORD HAUS

MANUAL OFICIAL PARA FAMILIAS · EDICIÓN 2026

Contenidos

El Rottweiler es una raza noble, fuerte e inteligente. También es una raza con necesidades específicas y con problemas de salud propios que se previenen —casi todos— con decisiones tomadas durante el primer año.

01 Los primeros días en casa

Qué preparar, la guata sensible del Rottweiler y la diarrea por estrés

02 Alimentación y crecimiento

El punto más crítico del primer año: calcio, calorías y condición corporal

03 Ejercicio y placas de crecimiento

Cuánto y qué tipo, según la edad

04 Salud propia del Rottweiler

Displasias, corazón, osteosarcoma, torsión gástrica, JLPP

05 Esterilización: cuándo

Por qué en esta raza la edad importa tanto

06 Tóxicos y venenos

Piscina, jardín, cocina y plantas

07 Parásitos y prevención

Interna, externa y calendario

08 Calor, frío y golpe de calor

Un perro negro en verano chileno

09 Socialización y etapas

De los 2 meses a los 2 años

10 Adiestramiento

Los cinco comandos que de verdad importan

11 Cerco, canil y seguridad

Contener a un perro que puede saltar, romper y cavar

12 Ley 21.020 y perros PPP

Tus obligaciones legales en Chile

13 Urgencias y botiquín

Qué es una emergencia real y qué hacer

14 Anexos

Calendario de controles y tabla de peso esperado

01 Los primeros días en casa

Tu cachorro acaba de perder a su madre, a sus hermanos y todo lo que conocía, el mismo día. La primera semana no se trata de enseñarle nada: se trata de que se sienta seguro.

Qué tener listo antes de que llegue

- ☐ Jaula o corral de descanso, con cama lavable
- ☐ Comederos de acero inoxidable
- ☐ El mismo alimento que come acá, comprado **antes** de que llegue
- ☐ Zona de baño en superficie dura y lavable
- ☐ Paños absorbentes desechables
- ☐ Cloro doméstico sin perfume para desinfectar
- ☐ Juguetes resistentes de goma dura
- ☐ Collar plano y correa de 1,5 a 2 m
- ☐ Cepillo de cerda dura
- ☐ Cortaúñas para razas grandes
- ☐ Termómetro digital
- ☐ Veterinario elegido y primer control agendado

ANTES DE NADA: LEE EL MANUAL DE PARVOVIRUS

Durante las primeras 16 a 20 semanas, las reglas de bioseguridad de ese manual tienen prioridad sobre todo lo que leas aquí sobre paseos y contacto con otros perros. Nada de lo de este manual justifica saltárselas.

Qué esperar la primera semana

- **Llanto nocturno.** Es normal y dura pocos días. Ubica su cama en tu pieza al principio: acompañarlo de noche acelera la adaptación y no crea "mañas".
- **Menos apetito uno o dos días.** Por estrés del cambio.
- **Deposiciones más blandas.** Casi seguro. Lee el apartado siguiente completo.
- **Dormir mucho.** Un cachorro de 2 meses duerme 18 a 20 horas al día. Necesita ese descanso y hay que protegerlo de las visitas y de los niños.

La guata del Rottweiler: lo primero que hay que entender

El Rottweiler tiene un aparato digestivo notoriamente sensible. Es una característica de la raza, no un defecto de tu cachorro ni un error tuyo.

Y hay un dato que casi nadie le advierte a las familias: **el cambio de hogar es uno de los episodios más estresantes de la vida de un cachorro.** Pierde a su madre, a sus hermanos, sus olores, sus rutinas y su

territorio, todo en un mismo día. Ese estrés altera el intestino de forma directa —hay una conexión nerviosa y hormonal real entre el cerebro y el tubo digestivo— y el resultado, en esta raza, es casi previsible:

La mayoría de los cachorros Rottweiler hacen diarrea blanda durante los primeros 3 a 7 días en su casa nueva. No es que le hayamos entregado un cachorro enfermo, ni que tú lo estés alimentando mal. Es estrés de adaptación, y se pasa solo.

CÓMO BAJAR EL RIESGO

- **Que siga comiendo lo mismo la primera semana.** Te decimos con anticipación cuál es su alimento, para que lo tengas resuelto antes de que llegue y no haya ningún cambio de dieta encima del cambio de casa.
- **Si quieres cambiarlo, cámbialo gradualmente.** Se puede perfectamente, pero nunca de un día para otro y ojalá no durante la primera semana, mientras se está adaptando. La transición correcta toma **7 a 10 días**: 25% del nuevo los días 1–3, 50% los días 4–6, 75% los días 7–8 y 100% desde el día 9.
- **Nada nuevo la primera semana.** Ni premios distintos, ni huesos, ni leche, ni comida humana, ni suplementos. Un solo cambio a la vez.
- **Raciones más pequeñas y más frecuentes** los primeros días: en vez de 4 comidas, 5 o 6 porciones chicas. Un intestino estresado tolera mejor volúmenes pequeños.
- **Agua siempre disponible**, pero sin dejar que se tome un litro de golpe.
- **Bájale las visitas.** Las primeras 48 horas debería conocer solo a su familia. Todos queremos mostrarlo, pero cada persona nueva es más estrés.
- **Protege su sueño.** Un cachorro que no duerme sus 18 horas se estresa más y hace más diarrea.
- **Probióticos.** Pregúntale a tu veterinario por una pasta probiótica para cachorros. Dársela desde el día de la llegada, de forma preventiva, reduce bastante los episodios.

DIARREA DE ADAPTACIÓN O ALGO GRAVE: CÓMO DISTINGUIRLAS

Esto es lo más importante de esta página, y es donde no puedes equivocarte. Es exactamente el mismo cuadro con el que empieza el parvovirus.

SEÑAL	DIARREA DE ADAPTACIÓN	SEÑAL DE ALARMA
Ánimo	Juega, explora, mueve la cola, te sigue	Decaído, se esconde, no responde
Apetito	Come, aunque quizá algo menos	Rechaza la comida por completo
Vómito	No hay, o uno aislado	Vómitos repetidos, o vomita el agua
Aspecto de la deposición	Blanda o pastosa, color normal	Líquida, con sangre, o color muy oscuro
Olor	Fuerte pero normal	Penetrante, dulzón, característico
Encías	Rosadas y húmedas	Pálidas, blancas o pegajosas
Evolución	Mejora en 24–72 horas	Igual o peor a las 12 horas

LA REGLA QUE NO SE NEGOCIA

Diarrea **sola**, con el cachorro comiendo y jugando: observa, aplica lo de arriba y avísanos.

Diarrea + **decaimiento**, o + **vómitos**, o + **rechazo de comida**, o **con sangre**: eso es urgencia veterinaria **ahora**, no mañana. Consulta el manual de parvovirus, módulos 07 y 08.

QUÉ HACER Y QUÉ NO DURANTE UN EPISODIO LEVE

SÍ	NO
Mantener el mismo alimento, en porciones más chicas	Cambiar de marca de golpe "a ver si le cae mejor"
Probiótico indicado por tu veterinario	Antidiarreicos humanos o "los que te sobraron" de otro perro
Agua fresca disponible	Dejarlo en ayuno prolongado: un cachorro no lo tolera
Sacar una muestra de deposición si vas al veterinario	Leche, yogur, arroz solo o remedios caseros
Registrar cuántas veces y cómo, para poder informarlo	Esperar más de 72 horas sin consultar

SI DURA MÁS DE 72 HORAS

Ya no es estrés de adaptación. Las causas más frecuentes a esa altura son **parásitos** —especialmente **Giardia** y coccidios, que no se ven a simple vista— o una intolerancia alimentaria. Lleva una **muestra fresca de deposición** al veterinario; con eso se resuelve en un examen simple. Y recuerda: durante la zona crítica, mejor que el veterinario vaya a tu casa.

ESCRÍBENOS

Ante cualquier duda con la guata de tu cachorro, avísanos aunque te parezca menor. Conocemos a sus padres, a sus hermanos y sabemos qué es normal en esta línea. Muchas veces te podemos tranquilizar en dos minutos —y las veces que no, vamos a ser los primeros en decirte que salgas a urgencias de inmediato.

Rutina desde el día uno

El Rottweiler es una raza que prospera con estructura. Establece horarios fijos de comida, descanso, juego y baño desde el primer día: te va a ahorrar meses de problemas.

- **Baño:** lo llevas a su zona al despertar, después de cada comida, después de cada juego y antes de dormir. Premias en el momento exacto en que termina.
- **Comida:** 4 veces al día hasta los 4 meses, 3 hasta los 6, luego 2 de por vida.
- **Descanso:** su jaula o corral es su refugio, nunca un castigo. Nadie lo molesta ahí.

02 Alimentación y crecimiento

Este es el módulo más importante del manual. Más del 70% de los problemas ortopédicos que vemos en Rottweiler adulto se decidieron en el plato durante el primer año.

Las tres reglas que definen su esqueleto

1 Alimento formulado para cachorro de raza grande. Sin excepción.

No es marketing. Un alimento de raza grande tiene **calcio y fósforo controlados** y una densidad calórica menor, diseñados para que el hueso crezca más lento y más firme. Un alimento de cachorro estándar —o peor, uno de "todas las razas"— tiene demasiado calcio y demasiada energía para un perro que va a pesar 50 kilos.

En la etiqueta busca que diga explícitamente **"razas grandes"** o **"large breed puppy"**, y que el envase indique que cumple los perfiles AAFCO **incluyendo crecimiento de razas grandes (más de 32 kg de peso adulto)**.

2 Nunca suplementes calcio

Ni calcio, ni huesos molidos, ni cáscara de huevo, ni leche, ni "vitaminas para que crezca fuerte".

El cachorro de raza grande **no regula la absorción de calcio** como lo hace un adulto: absorbe todo lo que le des. El exceso provoca **osteochondrosis, OCD y deformidades óseas** —justamente el daño que creías estar previniendo. Un buen alimento de raza grande ya trae exactamente lo que necesita.

3 Manténlo delgado. Siempre.

Un cachorro gordo no es un cachorro sano: es un cachorro con el doble de carga sobre articulaciones que todavía se están formando. En Rottweiler, el sobrepeso durante el crecimiento es un factor de riesgo directo de **displasia de cadera y de codo**.

La condición corporal ideal durante el crecimiento es **4 de 9** — es decir, un poco más delgado de lo que a la mayoría de la gente le parece "normal".

CÓMO EVALUARLO EN 10 SEGUNDOS

- **Costillas:** las palpas fácilmente pasando la mano, sin apretar. No deben verse marcadas, pero sí sentirse.
- **Desde arriba:** se le nota la cintura detrás de las costillas.
- **De perfil:** el abdomen sube hacia atrás, no va recto ni colgando.

Un estudio de seguimiento de por vida en perros mostró que los mantenidos delgados vivieron cerca de **dos años más** y desarrollaron artrosis mucho más tarde. Es la intervención más barata y más efectiva que existe.

Cuánto y cuándo

EDAD	COMIDAS AL DÍA	NOTAS
2 a 4 meses	4	Porciones medidas con taza, nunca a libre disposición
4 a 6 meses	3	Etapas de mayor velocidad de crecimiento: vigila que no engorde
6 a 18 meses	2	Mantener alimento de cachorro raza grande hasta los 18-24 meses
Adulto	2	Nunca una sola comida diaria: aumenta riesgo de torsión gástrica

AJUSTA POR EL PERRO, NO POR LA TABLA

La cantidad del envase es un punto de partida, no una orden. Pesa a tu cachorro cada dos semanas y ajusta la ración según su **condición corporal**. Si se está poniendo redondo, baja un 10%. Si se le marcan las costillas a simple vista, sube un 10%.

Cómo reconocer un buen alimento

- El primer ingrediente es **carne o harina de carne identificada** (pollo, cordero), no "subproductos" ni "harinas de origen animal" genéricas.
- Aporta **DHA/EPA**, importantes para el desarrollo neurológico y cognitivo.
- Minerales quelados, mejor absorbidos.
- Sin colorantes ni saborizantes artificiales.
- Indica el perfil AAFCO para crecimiento de razas grandes.
- Señales de que le está haciendo bien: **heces compactas**, pelaje brillante, energía estable, sin picazón.

Cambios de alimento

Nunca de golpe. Transición en **7 a 10 días**: 25% nuevo los días 1-3, 50% los días 4-6, 75% los días 7-8, 100% desde el día 9. Un cambio brusco causa diarrea, y una diarrea en un cachorro no vacunado te va a hacer pasar un susto innecesario.

Premios sanos

Que no superen el **10% de las calorías del día**, y se descuentan de la ración.

- Pechuga o panitas de pollo cocidas, sin sal ni aliños
- Corazones de pollo cocidos
- Sardinas en agua, sin sal (excelente aporte de omega 3)
- Zanahoria cruda, trozos de manzana sin semillas, porotos verdes
- Su propia croqueta usada como premio durante el entrenamiento

NUNCA

Sobras de la mesa, salsas, frituras, huesos cocidos de cualquier tipo, embutidos, lácteos en cantidad, ni comida grasa. La **pancreatitis** por sobras humanas es una de las urgencias más frecuentes y más evitables de esta raza.

Agua

Fresca y disponible siempre, en recipiente de acero. Excepción: durante **una hora después de comer**, evita que beba grandes volúmenes de golpe, y no permitas beber compulsivamente después de ejercicio intenso. Ambas cosas se asocian a torsión gástrica (módulo 04).

03 Ejercicio y placas de crecimiento

En un cachorro de raza grande, el exceso de ejercicio hace tanto daño como la falta. La clave no es la cantidad: es el tipo.

ANTES DE LEER ESTA TABLA

Nada de lo que sigue se hace **fuera de casa** hasta 7 días después de la última dosis del esquema de seis vacunas —es decir, alrededor de los **5 meses**. Hasta entonces **no se saca a pasear**: ni a la vereda, ni a la plaza, ni "a la vuelta de la manzana". Todo el ejercicio de esos primeros meses es juego libre dentro de la casa, sobre superficies limpias.

Las edades de la tabla indican **qué tipo de esfuerzo tolera su esqueleto**, no autorización para salir.

Por qué hay que esperar

Las **placas de crecimiento** son zonas de cartílago blando en los extremos de los huesos largos, desde donde el hueso se alarga. En el Rottweiler se cierran alrededor de los **14 a 18 meses**. Hasta entonces, son el punto más frágil del esqueleto: un impacto repetido en esa zona puede provocar lesiones que no se corrigen después.

EDAD	SÍ	NO
2 a 4 meses	Juego libre en casa, exploración, juegos mentales, sesiones cortas de obediencia	Caminatas forzadas, escaleras repetidas, saltos
4 a 6 meses	Paseos cortos en terreno plano y blando, 5 minutos por mes de edad, dos veces al día	Correr junto a bicicleta, frisbee, saltos, cerros
6 a 12 meses	Paseos más largos a su ritmo, natación, trabajo de olfato	Trote sostenido en asfalto, agility con saltos, juegos de arranque y frenada brusca
12 a 18 meses	Aumento progresivo de intensidad y distancia	Deporte de impacto o competición hasta confirmar cierre de placas
Más de 18 meses	Ejercicio pleno según condición física	Sedentarismo: necesita 1 a 2 horas diarias de por vida

LA REGLA DE LOS 5 MINUTOS

Cinco minutos de paseo estructurado por cada mes de edad, dos veces al día. Un cachorro de 4 meses: 20 minutos, dos veces. Esto **no** incluye el juego libre en casa, donde él mismo regula su esfuerzo y se detiene cuando se cansa.

Superficies

- **Buenas:** pasto, tierra firme, arena compacta, alfombra.
- **Malas:** cerámica y piso flotante en casa —resbala y fuerza la cadera. Pon alfombras o pasillos antideslizantes en las rutas que más usa.

- **A limitar:** asfalto y cemento para trote repetido; en verano además quema las almohadillas.

Escaleras y saltos

Hasta los 6 meses, evita que suba y baje escaleras repetidamente y que salte desde el sillón, la cama o la maleta del auto. Usa una rampa para el auto o súbelo tú. Bajar es peor que subir: concentra todo el impacto en los codos.

Estimulación mental: la mitad que se olvida

Un Rottweiler aburrido destruye cosas y desarrolla conductas problemáticas. Quince minutos de trabajo mental cansan más que una hora de correr:

- Esconder premios por la casa y que los busque con el olfato
- Kong relleno y congelado
- Juguetes dispensadores y alfombras de olfato
- Sesiones cortas de obediencia, 5 minutos, varias veces al día
- Enseñarle a esperar la comida antes de comer

04 Salud propia del Rottweiler

Toda raza pura tiene su lista. Conocer la del Rottweiler te permite detectar a tiempo, y en varios casos, prevenir.

Displasia de cadera y de codo

Es el problema ortopédico más frecuente de la raza. Tiene un componente genético —por eso seleccionamos reproductores con evaluación radiográfica— pero **el ambiente pesa tanto como los genes**: peso, alimentación y ejercicio durante el crecimiento.

- **Señales:** "salto de conejo" al correr, dificultad para levantarse, cojera después del ejercicio, no querer subir escaleras, cambio en la forma de sentarse.
- **Cuándo evaluar:** radiografías oficiales de cadera y codo entre los **12 y 24 meses**. Si vas a criar, es obligatorio; si no, igual sirve para planificar su manejo.
- **Prevención real:** mantenerlo delgado, alimento de raza grande, controlar el impacto hasta los 18 meses, evitar pisos resbalosos.

Osteocondrosis y OCD

Defecto en la maduración del cartílago articular, típicamente en hombro, codo o rodilla. Aparece entre los 4 y 10 meses, justo en el pico de crecimiento. Se asocia a **exceso de calcio, sobrealimentación y crecimiento demasiado rápido**. Señal típica: cojera de una extremidad delantera que va y viene, en un cachorro grande que está creciendo rápido. Consulta sin esperar.

Osteosarcoma

El Rottweiler es una de las razas con **mayor incidencia de osteosarcoma** (cáncer óseo) del mundo. Es agresivo y el diagnóstico temprano cambia el pronóstico.

Regla de oro: cualquier cojera en un Rottweiler adulto que no mejora en **una semana**, o cualquier aumento de volumen duro y doloroso en una extremidad —típicamente cerca de la muñeca o de la rodilla— se estudia con **radiografía**. No con antiinflamatorios y paciencia.

Torsión gástrica (dilatación-vólvulo, GDV)

El estómago se dilata y gira sobre su eje, cortando la circulación. **Es mortal en horas sin cirugía**. El Rottweiler, por ser de pecho profundo, está entre las razas de riesgo.

RECONOCERLA: LOS 4 SIGNOS

1. **Arcadas improductivas** — intenta vomitar y no sale nada. Es el signo clave.
2. **Abdomen distendido y duro**, sobre todo del lado izquierdo.
3. **Inquietud, no puede acomodarse**, camina de un lado a otro, se queja.
4. **Salivación excesiva**, encías pálidas, respiración rápida.

Esto es una urgencia quirúrgica inmediata. No esperes, no le des agua, no intentes nada en casa. Directo a la clínica más cercana con pabellón.

CÓMO REDUCIR EL RIESGO

- Dos comidas diarias, nunca una sola grande.
- Comedero a nivel del suelo, no elevado.
- Si come muy rápido, usa comedero antivoracidad.
- Sin ejercicio intenso desde **1 hora antes hasta 2 horas después** de comer.
- Evitar que beba grandes volúmenes de golpe después de comer o de correr.
- **Gastropexia preventiva:** conversa con tu veterinario la posibilidad de fijar el estómago durante otra cirugía programada, como la esterilización. En razas de riesgo es una decisión razonable.

Corazón: estenosis subaórtica (SAS)

Es el defecto cardíaco congénito clásico de la raza. Se detecta como un **soplo** en la auscultación del cachorro. Muchos soplos de cachorro son inocentes y desaparecen, pero en un Rottweiler siempre hay que descartar SAS.

Qué hacer: si en algún control aparece un soplo, pide **ecocardiografía con un cardiólogo veterinario** alrededor de los 4 a 6 meses. Un SAS leve puede tener vida normal con manejo; uno severo cambia por completo el plan de ejercicio del perro.

JLPP

Parálisis laríngea y polineuropatía juvenil: una enfermedad genética hereditaria propia del Rottweiler, autosómica recesiva. Aparece entre los 2 y 9 meses con voz ronca, ruido al respirar, atragantamiento e incoordinación. **Existe test de ADN**, y por eso los reproductores deben estar testeados. Si escuchas un cambio de voz o ruido respiratorio en tu cachorro, consúltalo de inmediato y menciona JLPP por nombre.

Otros a tener en el radar

CONDICIÓN	SEÑALES	QUÉ HACER
Rotura de ligamento cruzado	Cojera brusca de una pata trasera, no apoya	Frecuente en la raza. Consulta ortopédica; el sobrepeso es el factor de riesgo principal
Hipotiroidismo	Aumento de peso sin comer más, pelaje opaco, apatía, piel gruesa	Aparece en adultos jóvenes. Se diagnostica con análisis de sangre y se trata bien
Entropión / ectropión	Ojo lloroso, entrecerrado, irritado	Párpado mal posicionado. Evaluación oftalmológica; a veces requiere cirugía
Atrofia progresiva de retina	Choca con cosas en penumbra, pupilas muy dilatadas	Evaluación oftalmológica; existen test genéticos
Dermatitis y alergias	Se rasca, se lame las patas, orejas con mal olor	Descartar pulgas primero, luego alimentaria o ambiental
Otitis	Sacude la cabeza, se rasca la oreja, olor	Revisar y limpiar orejas semanalmente, sobre todo si nada

Enfermedades infecciosas

El **parvovirus** tiene manual propio y es la prioridad absoluta durante los primeros meses. Además, mantén al día:

- **Distemper (moquillo):** fiebre, secreción nasal y ocular, tos y, en fase avanzada, tics neurológicos irreversibles. Cubierto por la vacuna núcleo.
- **Leptospirosis:** se contagia por orina de roedores en agua estancada o barro. Relevante en parcelas y zonas rurales. Vacuna **anual**, no cada 3 años.
- **Tos de las perreras:** importante si va a guardería, peluquería o pensión.
- **Giardia y coccidios:** diarrea crónica, mal olor y retraso en el crecimiento. Se diagnostican con examen de deposiciones, no se ven a simple vista.

Cuidados de rutina

CUIDADO	FRECUENCIA	NOTAS
Cepillado	2 veces por semana	Cerda dura o guante de goma. En muda, a diario
Baño	Cada 6 a 8 semanas	Champú específico para perro. Bañar de más daña el manto
Uñas	Cada 3 a 4 semanas	Si suenan al caminar, están largas. Uñas largas alteran la postura
Orejas	Semanal	Revisión y limpieza con producto ótico, nunca cotonitos profundos
Dientes	2 a 3 veces por semana	Pasta dental canina. La enfermedad periodontal es muy frecuente y afecta corazón y riñón
Peso	Mensual	Registrar. Ver anexo B

05 Esterilización: cuándo

En el Rottweiler, **cuándo** se esteriliza importa más que en casi cualquier otra raza. Y la recomendación cambió respecto de lo que se decía hace veinte años.

Qué muestra la evidencia

El estudio de referencia de la Universidad de California, Davis, analizó 35 razas y evaluó cómo se relaciona la edad de esterilización con trastornos articulares y ciertos cánceres. En el Rottweiler los hallazgos fueron especialmente marcados:

- En **machos**, esterilizar antes del año se asoció a un aumento importante de **trastornos articulares** respecto de los machos enteros.
- En **hembras**, esterilizar antes de los 12 meses se asoció a un aumento marcado del riesgo de **osteosarcoma**.

La explicación es mecánica: las hormonas sexuales son la señal que cierra las placas de crecimiento. Sin ellas, los huesos largos siguen creciendo más tiempo, las proporciones cambian y las articulaciones quedan peor alineadas de por vida.

NUESTRA RECOMENDACIÓN

- **Machos:** esperar hasta **al menos los 18 a 24 meses**, idealmente después del cierre de placas de crecimiento.
- **Hembras:** no antes de los **12 meses**, y preferentemente después de los 18. Conversa el balance con tu veterinario, porque en hembras hay que ponderar además el riesgo de piómetra y de tumores mamarios.
- Si de todas formas se va a operar, evalúa aprovechar la anestesia para una **gastropexia preventiva** (módulo 04).

ESTO ES UNA CONVERSACIÓN, NO UNA REGLA RÍGIDA

La decisión depende también de tu situación: si hay hembras sin esterilizar en casa, si el perro tiene escapes, si hay problemas de conducta. Lleva esta página a tu veterinario y decídanlo juntos, con la información sobre la mesa. Lo que sí te pedimos es que **no lo esterilices a los 6 meses "porque es lo que se hace"**. En esta raza, esa decisión tiene costo.

06 Tóxicos y venenos

El Rottweiler explora el mundo con la boca. La intoxicación es una de las urgencias más frecuentes de la raza, y casi siempre ocurre en su propia casa.

Productos de piscina

- **Algicidas (amonios cuaternarios):** extremadamente tóxicos. Provocan úlceras, daño en glóbulos blancos y colapso sistémico. Una cantidad mínima puede ser mortal.
- **Decantadores (sulfato de aluminio):** vómitos, diarrea, dolor abdominal intenso, riesgo de pancreatitis.
- **Cloro concentrado:** quemaduras del esófago y estómago, riesgo de perforación.

Si hay piscina, los productos van bajo llave y la piscina se mantiene tapada o inaccesible. Beber agua con cloro alto también causa gastritis.

Venenos comunes

TÓXICO	DÓNDE ESTÁ	EFFECTOS
Raticidas (warfarinas, brometalina)	Parcelas, bodegas, vecinos	Hemorragias internas, anemia severa, edema cerebral
Insecticidas (cipermetrina, carbaryl)	Jardines, agricultura	Temblores, salivación, convulsiones, shock
Herbicidas (glifosato, paraquat)	Parcelas, chacras	Daño renal e intestinal grave, vómitos persistentes
Anticongelante (etilenglicol)	Garajes	Sabor dulce, muy atractivo. Falla renal aguda. Extremadamente letal
Limpiadores fuertes, soda cáustica	Hogar	Quemaduras, vómitos, colapso respiratorio
Ibuprofeno, paracetamol	Botiquín de la casa	Úlceras, falla renal y hepática. Nunca dar medicación humana

Alimentos prohibidos

ALIMENTO	DAÑO
Chocolate y cacao	Arritmias, convulsiones, muerte súbita
Uvas y pasas	Falla renal aguda, incluso en cantidades pequeñas
Cebolla, ajo, puerro	Anemia hemolítica
Xilitol (chicles, dulces, mantequilla de maní "sin azúcar")	Hipoglucemia grave y falla hepática. Extremadamente peligroso
Palta	Vómitos y diarrea; el hueso además obstruye
Huesos cocidos	Se astillan: perforación intestinal
Masa cruda con levadura y alcohol	Fermentación gástrica, distensión y shock metabólico
Macadamia y nueces	Debilidad, temblores, vómitos
Café y bebidas energéticas	Taquicardia, convulsiones

Plantas tóxicas frecuentes en Chile

PLANTA	DÓNDE	DAÑO
Adelfa / laurel de flor	Jardines, medianas de calle	Falla cardíaca fulminante
Floripondio	Plazas y jardines	Convulsiones, alucinaciones, midriasis
Cicuta	Terrenos y campos	Parálisis progresiva
Hiedra	Cercos y muros	Irritación oral, vómitos
Azalea y rododendro	Jardines	Vómitos, arritmias, colapso
Bulbos de tulipán y narciso	Maceteros	Irritación digestiva severa
Ricino	Sitios eriazos	Una de las semillas más tóxicas que existen

SI SOSPECHAS INTOXICACIÓN

1. **No provoques el vómito** por tu cuenta. Con corrosivos e hidrocarburos empeora gravemente el daño.
2. **Lleva el envase** o una foto de la etiqueta. Es lo primero que necesita el veterinario.
3. Anota **qué, cuánto y a qué hora**.
4. Traslado inmediato. En intoxicaciones, el margen de acción se mide en minutos.
5. No administres carbón activado sin indicación: en algunos casos está contraindicado.

07 Parásitos y prevención

Desparasitación interna

EDAD	FRECUENCIA
2 semanas a 3 meses	Cada 15 días
3 a 12 meses	Cada 30 días
Adulto	Cada 3 meses, de por vida

Un examen coproparasitario una o dos veces al año permite ajustar el producto según lo que realmente tenga. Algunos parásitos —como **Giardia**— no responden a los desparasitarios comunes y necesitan tratamiento específico.

ZOONOSIS

Varios parásitos intestinales del perro se transmiten a las personas, especialmente a niños. Recoger deposiciones a diario y lavarse las manos no es solo higiene: es salud familiar.

Desparasitación externa

- Antiparasitario mensual o trimestral según producto y peso: isoxazolinas orales (Bravecto, Simparica, NexGard) o pipetas de buena calidad.
- Ajustar la dosis **cada mes durante el crecimiento**: un cachorro sube de peso rápido y la dosis se queda corta enseguida.
- Tratar también el ambiente: camas, alfombras y grietas, donde vive el 95% de la población de pulgas.

EVITA

Collares antipulgas baratos y productos "naturales" sin registro: no protegen y provocan dermatitis de contacto. **Nunca uses antipulgas de gato en perros** ni al revés: la permetrina es tóxica para los gatos, y varias fórmulas felinas son inefectivas en perro.

08 Calor, frío y golpe de calor

Un perro negro, grande, musculoso y de hocico relativamente corto en un verano chileno es una combinación de riesgo real.

Por qué el Rottweiler es sensible al calor

- Manto negro que absorbe radiación solar.
- Masa corporal grande: genera mucho calor y lo disipa lento.
- Hocico más corto que el de otras razas de trabajo: jadea con menos eficiencia.

GOLPE DE CALOR: RECONOCERLO Y ACTUAR

Signos: jadeo intenso que no cede, salivación espesa, lengua y encías muy rojas o azuladas, tambaleo, vómitos, desorientación, colapso.

Qué hacer, en este orden:

1. Sacarlo del calor de inmediato, a la sombra o a un lugar con aire.
2. Mojarlo con **agua fresca, no helada**, especialmente cuello, axilas e ingles. El agua helada provoca vasoconstricción y empeora el enfriamiento.
3. Ventilarlo mientras está mojado.
4. Ofrecer agua fresca solo si está consciente y puede tragar. Sin forzar.
5. **Trasladar al veterinario aunque parezca recuperado.** El daño interno —renal, de coagulación— aparece horas después.

Prevención en verano

- Paseos solo temprano en la mañana o al atardecer.
- Prueba del dorso de la mano: si no aguantas 5 segundos sobre el pavimento, le quema las almohadillas.
- Sombra permanente y agua fresca abundante, en más de un punto.
- Piscina para perros o manguera como enfriamiento activo.
- **Jamás dejarlo en el auto**, ni con ventanas abiertas, ni "cinco minutos".
- No raparlo: el manto también aísla del calor y protege de quemaduras solares.

Frío

Tolera bien el frío moderado, pero un cachorro no regula su temperatura como un adulto. En invierno necesita cama elevada del suelo, seca y protegida de corrientes. Si vive afuera, el canil debe tener piso aislado, techo y paredes cortavientos.

09 Socialización y etapas

Un Rottweiler equilibrado no nace: se construye, y la mayor parte se construye antes de los seis meses.

La ventana crítica

La ventana de socialización se cierra alrededor de las **12 a 16 semanas**. Lo que aprenda a aceptar en ese período lo va a aceptar de por vida. Lo que no conozca, tenderá a temer o a rechazar de adulto —y un adulto de 50 kilos que teme algo es un problema serio.

EL CONFLICTO CON LA CUARENTENA SANITARIA

La ventana de socialización coincide exactamente con el período de riesgo de parvovirus. **La solución no es elegir una:** es socializar en entornos controlados sin exponerlo al suelo público. El módulo 06 del manual de parvovirus explica exactamente cómo.

Qué debe conocer antes de las 16 semanas

- ☐ Hombres, mujeres, adultos mayores
- ☐ Niños tranquilos, supervisados
- ☐ Personas con barba, gorro, casco, uniforme
- ☐ Sillas de ruedas, bastones, coches
- ☐ Aspiradora, secador, timbre, lavadora
- ☐ Tráfico, bocinas, motos, sirenas
- ☐ Fuegos artificiales (grabados, volumen bajo)
- ☐ Superficies: cerámica, alfombra, metal, madera
- ☐ Viajar en auto sin miedo
- ☐ Manipulación de patas, orejas, boca y uñas
- ☐ Quedarse solo períodos cortos
- ☐ Perros adultos conocidos y vacunados

Siempre a distancia y volumen que el cachorro tolere bien, asociado a comida, sin forzar y sin llevarlo al miedo. Una mala experiencia enseña más rápido que diez buenas.

Etapas del desarrollo

EDAD	QUÉ PASA	QUÉ HACER
2 a 3 meses	Adaptación al hogar. Mordisqueea todo: está explorando con la boca	Rutina, socialización controlada, obediencia básica en sesiones de 3–5 minutos
3 a 4 meses	Primer período de miedo. Puede asustarse de cosas que antes ignoraba	No forzar ni consolar en exceso. Actuar con normalidad y bajar la intensidad
4 a 6 meses	Cambio de dientes, mucha energía, conducta más desordenada	Juguetes de mordida adecuados. Mantener límites con calma y constancia
6 a 12 meses	Adolescencia. Prueban límites, "se les olvida" lo aprendido, se ponen selectivos	La etapa que más gente abandona. Constancia, estructura y ejercicio mental
12 a 24 meses	Madurez física y luego mental. Aparece el instinto de guarda	Reforzar obediencia en presencia de distracciones. Refrescar socialización
Más de 24 meses	Carácter adulto establecido	Mantenición: ejercicio, trabajo mental y refuerzo periódico

SOBRE EL INSTINTO DE GUARDA

El Rottweiler protege por naturaleza; no hay que enseñárselo y **no se debe fomentar**. Un perro al que se lo entrena para desconfiar termina siendo un perro inseguro y reactivo. El buen perro guardián es el perro equilibrado que distingue una situación real de una visita normal — y eso se logra con socialización, no con provocación.

10 Adiestramiento

Un Rottweiler adulto pesa entre 40 y 60 kilos. La obediencia no es un lujo estético: es la herramienta que hace posible convivir con él en el mundo real.

Cuándo empezar

A las 8 semanas, desde el primer día en casa. No hay que esperar a "que crezca". Sesiones de **3 a 5 minutos**, varias veces al día, siempre terminando en un acierto.

Los cinco comandos que de verdad importan

COMANDO	PARA QUÉ SIRVE EN LA VIDA REAL
Ven	El más importante de todos. Puede salvarle la vida si se suelta o corre hacia la calle
Sentado	Control básico. Es el "botón de pausa" que usarás mil veces al día
Quieto	Autocontrol. Que se quede aunque tú te muevas o pase algo interesante
Suelta / deja	Evita que trague un tóxico, un hueso o un objeto peligroso
Junto	Caminar sin tirar. Con 50 kilos, esto define si el paseo es posible

Reglas del entrenamiento

- **Refuerzo positivo.** Premia la conducta correcta en el mismo segundo en que ocurre.
- **Nada de castigo físico ni gritos.** Con un Rottweiler el castigo no genera obediencia: genera desconfianza, y una raza de este porte desconfiada es un problema de seguridad.
- **Consistencia.** Toda la familia usa las mismas palabras y las mismas reglas. Si uno lo deja subir al sillón y otro no, el perro no aprende: aprende a probar.
- **Sesiones cortas y frecuentes** son mejores que una sesión larga semanal.
- **Termina siempre bien.** Cierra cada sesión con algo que sabe hacer.
- **Evita el tironeo brusco** de juguetes mientras cambia los dientes, y los juegos que premian la mordida sobre manos o ropa.

Manejo de la mordida de cachorro

Todos los cachorros muerden; es normal y necesario para aprender a controlar la fuerza. Cuando muerda fuerte: un "ay" seco, retiras la atención 10 segundos y le ofreces un juguete adecuado. Nunca le pegues en el hocico ni le sujetes la boca: enseña a temer las manos.

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Toma un curso de obediencia con un adiestrador profesional que trabaje con refuerzo positivo. En Chile, además, **el curso de adiestramiento es una obligación legal** para dueños de razas PPP (módulo 12). Hazlo bien y de una vez.

11 Cerco, canil y seguridad

Un Rottweiler puede saltar más alto de lo que imaginas, romper una estructura liviana y cavar por debajo de un cerco. Contenerlo es responsabilidad exclusivamente tuya.

Requisitos del cierre perimetral

- **Altura mínima 1,80 m.** Sin objetos apoyados cerca que sirvan de escalón: maceteros, leña, tambores, sillas.
- **Estructura metálica sólida** o albañilería. La madera liviana y la malla delgada no resisten a un adulto motivado.
- **Base enterrada 30 a 40 cm** o zócalo de hormigón, para impedir el escape por cavado.
- **Portones con doble cierre** o candado, y cierre automático si es posible.
- **Doble puerta** en la entrada principal si es viable: evita la fuga cuando llega alguien.

El canil

- Piso lavable, con pendiente para drenaje.
- Techo y una zona de sombra permanente.
- Cama elevada del suelo, seca.
- Espacio suficiente para moverse; el canil es un lugar de descanso, **no donde vive el perro**.
- Agua siempre disponible, en recipiente que no pueda volcar.

POR QUÉ ESTO ES TAN SERIO

Un Rottweiler suelto en la calle puede asustar a un vecino, provocar un accidente de tránsito, ser atropellado, intoxicarse o pelear con otro perro. Y en Chile, tratándose de una raza PPP, un solo incidente puede derivar en consecuencias legales graves para ti y en una orden que afecte al perro. **El cerco no es un gasto: es un seguro.**

Identificación

- **Microchip obligatorio** e inscripción en el Registro Nacional de Mascotas.
- Placa con tu teléfono en el collar, siempre puesta.
- Mantén los **datos de contacto actualizados** en el registro: un chip con un teléfono antiguo no sirve de nada.
- Ten fotos actuales del perro, de frente y de perfil, por si necesitas difundirlas.

12 Ley 21.020 y perros PPP

En Chile, el Rottweiler está incluido en la lista de razas potencialmente peligrosas. No es una opinión ni una ordenanza municipal aislada: es normativa nacional, y te impone obligaciones concretas.

El marco legal

La **Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía** —conocida como "Ley Cholito"— y su reglamento establecen las obligaciones de todo dueño de perro, y un régimen adicional para los clasificados como **Perros Potencialmente Peligrosos (PPP)**.

El reglamento identifica nueve razas dentro de esa categoría: **Rottweiler**, Bullmastiff, Doberman, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Pit Bull, Presa Canario, Presa Mallorquín y Tosa Inu. Además, un perro de cualquier raza puede ser declarado PPP por su conducta o por registros de mordedura.

QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ NO

Estar en esa lista **no significa que tu perro sea agresivo**. Significa que, por su tamaño y fuerza, un incidente puede tener consecuencias graves, y por eso la ley exige un estándar de manejo más alto. Es exactamente lo mismo que exigir licencia especial para conducir un camión.

Tus obligaciones como dueño de un PPP

OBLIGACIÓN	DETALLE
Ser mayor de edad	El responsable inscrito debe tener 18 años o más
Inscripción y microchip	Registro Nacional de Mascotas, con datos actualizados
Bozal, correa y arnés o collar	Obligatorios en todo espacio público, siempre y sin excepción
Curso de adiestramiento	El responsable debe realizar un curso de tenencia y obediencia
Cierre perimetral seguro	Espacio adecuado del que el perro no pueda salir por sus propios medios
Seguro de responsabilidad civil	Exigido por la normativa. Verifica en tu municipalidad cómo se está aplicando en tu comuna
Señalización	Muchos municipios exigen aviso visible de la presencia del perro en el acceso

SI TU PERRO PROVOCA LESIONES

El dueño responde civil y eventualmente penalmente. La autoridad puede ordenar esterilización, adiestramiento obligatorio, reclusión domiciliaria del animal, cursos de tenencia responsable y evaluación del responsable. El costo de un cerco bien hecho y un curso de obediencia es infinitamente menor que el de un incidente.

Recomendaciones prácticas

- Acostumbra al bozal **desde cachorro**, como algo positivo y asociado a premios. Un perro que aprende a usarlo a los 3 meses lo usa toda la vida sin drama; uno que lo conoce a los 3 años, no.
- Usa correa corta y firme en la calle. Nada de correas extensibles.
- Guarda copia digital del registro, del certificado del curso y de la póliza del seguro.
- Consulta la ordenanza de **tu municipalidad**: varias añaden exigencias propias.
- Sé el dueño de Rottweiler que hace que la gente cambie de opinión sobre la raza. Esa es, honestamente, la mejor defensa que la raza tiene.

13 Urgencias y botiquín

El Rottweiler tiende a ocultar el dolor. Cuando muestra síntomas evidentes, el cuadro suele llevar tiempo avanzando.

Señales que justifican consulta el mismo día

- Vómitos o diarrea, sobre todo en cachorro
- Deja de comer o de beber
- Decaimiento o duerme más de lo habitual
- Encías pálidas, blancas o azuladas
- Tiembla, jadea en reposo o evita moverse
- Abdomen distendido o duro
- Cojera que no mejora
- Dificultad o ruido al respirar
- Cambio de voz o ladrido ronco
- Orina con sangre o no logra orinar
- Convulsiones o desorientación
- Ojo cerrado, rojo o con secreción

URGENCIAS QUE NO ESPERAN NI UNA HORA

1. **Arcadas sin vomitar + abdomen hinchado** → torsión gástrica
2. **Vómito y diarrea con sangre en cachorro** → sospecha de parvovirus
3. **Golpe de calor** con tambaleo o colapso
4. **Ingestión de tóxico** conocido o probable
5. **Convulsión** que dura más de 2 minutos o se repite
6. **Atropello o caída**, aunque se vea bien
7. **Dificultad respiratoria** marcada
8. **Encías pálidas** con debilidad

Constantes normales

PARÁMETRO	RANGO NORMAL
Temperatura	38,0 – 39,2 °C
Frecuencia cardíaca (adulto)	60 – 120 latidos por minuto
Frecuencia respiratoria en reposo	10 – 30 respiraciones por minuto
Color de encías	Rosado. Relleno capilar menor a 2 segundos

Botiquín

- ☐ Termómetro digital
- ☐ Suero fisiológico estéril
- ☐ Gasas estériles, vendas y venda cohesiva
- ☐ Guantes desechables
- ☐ Tijeras de punta roma
- ☐ Pinzas
- ☐ Clorhexidina para heridas
- ☐ Solución ótica
- ☐ Paños absorbentes
- ☐ Manta limpia para traslados
- ☐ Jaula de transporte
- ☐ Bozal (también útil si tiene dolor)
- ☐ Cartilla de vacunas en lugar fijo
- ☐ Teléfonos de urgencia pegados a la vista

LO QUE NO VA EN EL BOTIQUÍN

Ningún medicamento humano. El ibuprofeno, el paracetamol y el diclofenaco provocan úlceras y falla renal o hepática en perros, incluso en dosis pequeñas. **Nunca mediques por tu cuenta.**

14 Anexos

Anexo A • Calendario del primer año

EDAD	QUÉ CORRESPONDE
8 semanas	Llegada a casa. Primer control veterinario dentro de las 72 h. Inicio de bioseguridad estricta
8–16 sem	Esquema de vacunación cada 2–4 semanas. Desparasitación cada 15 días. Socialización controlada en casa
16–20 sem	Dosis final y refuerzo de alto riesgo. Primera salida 7 días después de la última dosis
4–6 meses	Cambio de dientes. Evaluación de soplo cardíaco si corresponde. Inicio de paseos progresivos
6 meses	Revacunación núcleo (WSAVA 2024). Curso de obediencia. Dos comidas diarias
12 meses	Control anual. Evaluar continuar con alimento de cachorro raza grande hasta los 18–24 meses
12–24 meses	Radiografías oficiales de cadera y codo. Conversar edad de esterilización
Anual	Control general, no-núcleo (lepto), examen de deposiciones, limpieza dental si corresponde

Anexo B • Registro de peso

Pesar cada 2 semanas hasta los 6 meses, luego mensual. Lo importante no es el número exacto sino la **curva**: debe subir de forma sostenida y sin saltos bruscos.

siempre que lo necesites.

Nota importante. Este manual reúne buenas prácticas de manejo y recomendaciones vigentes al momento de su edición. **No reemplaza el diagnóstico ni las indicaciones de tu médico veterinario.** La información legal es referencial: verifica siempre la normativa vigente y la ordenanza de tu municipalidad.



Rutherford Haus

Rottweilers de excelencia

www.rutherfordhaus.cl · contacto@rutherfordhaus.cl · [@rutherfordhaus](https://www.instagram.com/rutherfordhaus)

Manual de cuidados del Rottweiler · Edición 2026