

PROTEGE SU VIDA



Guía de prevención del parvovirus en cachorros Rottweiler

Protocolo de bioseguridad, calendario de vacunación actualizado y
plan de emergencia para las primeras 20 semanas de vida.

RUTHERFORD HAUS

MANUAL OFICIAL PARA FAMILIAS · EDICIÓN 2026

Contenidos

Esta guía está pensada para leerse completa antes de que el cachorro llegue a casa, y para quedarse a mano durante los primeros cinco meses.

01 Bienvenida

Por qué te pedimos leer esto antes de recibirlo

02 Qué es el parvovirus

Cómo actúa, cómo se contagia y por qué el Rottweiler es más vulnerable

03 Las 8 reglas de bioseguridad

Semana 0 a 16+: lo que sí y lo que no

04 Desinfección que realmente funciona

Productos, diluciones y tiempos de contacto

05 Calendario de vacunación

Esquema actualizado y por qué cambió el refuerzo

06 Socializar sin exponerlo

El error contrario, igual de grave

07 Señales de alerta

Los 7 signos y el test casero de 60 segundos

08 Protocolo de emergencia

Qué hacer en la primera hora

09 Qué esperar del tratamiento

Hospitalización, costos y pronóstico

10 Si hubo parvo en tu casa

Descontaminación y cuándo puedes traer otro perro

11 Anexos imprimibles

Ficha de vacunas, hoja de emergencia y checklist veterinario

01 Bienvenida

Gracias por abrirle las puertas de tu hogar a un cachorro Rottweiler de Rutherford Haus.

El Rottweiler es una raza profundamente leal y sensible. Crea vínculos fuertes con su familia, aprende rápido y busca constantemente la guía de su humano. Pero también es una raza que, durante sus primeros meses, necesita cuidados específicos y estrictos para llegar sana a la adultez.

La amenaza más seria de esta etapa es el **parvovirus canino**. Es una enfermedad que mata cachorros todos los años en Chile, y que en la enorme mayoría de los casos **se puede evitar**. Ese es el único objetivo de esta guía.

No queremos asustarte. Queremos darte información clara, ordenada y accionable, para que sepas exactamente qué hacer cada semana hasta que tu cachorro esté protegido.

LO ESENCIAL EN UNA FRASE

Durante las primeras 16 a 20 semanas, tu cachorro **no tiene defensas completas**. En ese período, tú eres su sistema inmune.

Cada indicación de este manual está aquí porque salva vidas. Un descuido que parece menor —dejarlo pisar tierra, una visita a la plaza "solo un ratito", apoyarlo en el piso de la sala de espera del veterinario— es exactamente la vía de contagio más frecuente.

Sabemos que vas a recibir consejos de amigos, vecinos, redes sociales y a veces incluso de personas bienintencionadas que crecieron con perros. Muchos de esos consejos están desactualizados. Aquí encontrarás el protocolo que usamos nosotros y que respalda la literatura veterinaria actual.

"Prevenir es el mayor acto de amor que puedes ofrecer."

Si en cualquier momento tienes una duda —por pequeña que te parezca— escríbenos. Preferimos mil veces responder una pregunta "obvia" que enterarnos tarde de un problema.

Gracias por asumir este compromiso. Gracias por cuidar su vida.

Rutherford Haus · Rottweilers de excelencia

Instagram [@rutherfordhaus](#) · [www.rutherfordhaus.cl](#) · [contacto@rutherfordhaus.cl](#)

02 Qué es el parvovirus

Un virus extremadamente contagioso y extremadamente resistente, que ataca el intestino y el sistema inmune de los cachorros.

Cómo actúa

El parvovirus canino (CPV-2) destruye las células que recubren el intestino delgado y las células madre de la médula ósea. El resultado es doble y por eso es tan grave:

- El intestino deja de absorber agua y nutrientes → **diarrea, vómito y deshidratación acelerada**.
- La barrera intestinal se rompe → **las bacterias del intestino pasan a la sangre** (sepsis).
- Caen los glóbulos blancos → **el cachorro no puede defenderse de esa infección**.

Por eso un cachorro puede estar jugando en la mañana y estar en shock por la tarde. No es una exageración: es la evolución típica del cuadro.

Cuándo aparece

El período de incubación es de **3 a 7 días** (ocasionalmente hasta 14). Es decir: el contagio ocurrió aproximadamente **una semana antes** de que vieras el primer síntoma. Esto importa mucho, porque significa que "estuvo bien toda la semana" no descarta nada.

Por qué el Rottweiler es más vulnerable

La literatura veterinaria (entre otros, el **MSD/Merck Veterinary Manual**) describe una mayor susceptibilidad y peores resultados clínicos en **Rottweiler, Doberman, Pastor Alemán, Pit Bull y Labrador**. En el Rottweiler se combinan varios factores:

- Una respuesta inmune que madura más lento, lo que alarga la ventana de riesgo.
- Mayor caída de glóbulos blancos durante la infección.
- Cachorros grandes que se deshidratan y descompensan rápido.

LAS CIFRAS, SIN DRAMATIZAR

Sin tratamiento, la mortalidad en cachorros puede superar el **90%**. Con hospitalización iniciada a tiempo, la supervivencia sube típicamente a **80-95%**. En razas predispuestas como el Rottweiler el pronóstico es algo peor, y depende casi por completo de **cuántas horas pasaron desde el primer síntoma**.

Traducción práctica: la diferencia entre vivir y morir no la decide la suerte. La decide la hora en que llamaste a la clínica.

Que sea más vulnerable no significa que sea un perro "débil". Significa que el margen de error durante los primeros meses es más chico que en otras razas. Eso es todo.

Cómo se contagia

Este es el punto peor entendido. El parvovirus **no necesita el contacto directo con otro perro**. Se transmite por vía fecal-oral, y el virus viaja en cualquier cosa que haya tocado heces —aunque sean invisibles y estén secas

hace semanas.

VÍA DE CONTAGIO	SITUACIÓN REAL DONDE OCURRE
Suelo, tierra y pasto	Plazas, parques, antejardines, veredas, el pasto del vecino, la feria
Suelas de zapatos	La vía más frecuente: tú traes el virus a casa sin saberlo
Ruedas	Auto, coche de bebé, bicicleta, carro de supermercado
Superficies del veterinario	Piso de sala de espera, mesa de examen, pesa, jaulas
Perros portadores sanos	Un perro puede eliminar virus antes de verse enfermo y hasta semanas después de recuperarse
Manos y ropa	Visitas que vienen de la calle o que tienen perros en casa

POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL DE ELIMINAR

El parvovirus es un virus **sin envoltura**. Eso lo hace resistente al alcohol, a la mayoría de los limpiadores multiuso y a los desinfectantes de amonio cuaternario. Sobrevive **meses en interiores y hasta un año o más en tierra y pasto**, aguantando calor, frío, sequía y humedad.

Es exactamente por esto que el módulo 04 de esta guía existe: limpiar con lo que tienes bajo el lavaplatos, en la práctica, no sirve.

03 Las 8 reglas de bioseguridad

Desde que llega a casa hasta 7 días después de la última vacuna del esquema. Ese es el período que llamamos **zona crítica**.

1 No pisar suelo público hasta completar el esquema

Prohibido: plazas, parques, veredas, estacionamientos, ferias, playas, escuelas caninas, patios de amigos con perros y cualquier área verde compartida.

Cómo se hace en la práctica: si tienes que moverlo, va en brazos, en jaula de transporte o sobre una manta que sea solo suya. Nunca apoyado en el piso, ni "un segundo".

2 Cero contacto con perros externos, aunque se vean sanos

Un perro adulto vacunado puede eliminar virus sin mostrar ningún síntoma. También lo hace un perro que se recuperó de parvo hace tres semanas.

La excepción segura: perros que viven en tu casa, con esquema completo al día, que no salen a zonas de riesgo. Ese contacto sí es valioso para su desarrollo.

3 Ni tierra ni pasto, tampoco en tu propio patio

Esta es la regla que más cuesta aceptar. Si por tu antejardín o patio pasan otros perros, si tuviste un perro enfermo antes, o si simplemente no sabes qué pasó ahí en el último año, **ese suelo se considera contaminado**.

La alternativa: habilita una zona de baño en superficie dura y lavable —cerámica, cemento sellado, radier— o usa paños absorbentes. Esa zona se desinfecta a diario.

4 Protocolo de puerta

La vía de entrada número uno del virus a tu casa eres tú. Instala una rutina fija y que la sigan todos los que viven ahí:

- Los zapatos de calle **no pasan** del umbral. Se quedan afuera o en un cajón cerrado.
- Pediluvio o paño con cloro diluido en la entrada, cambiado a diario.
- Lavado de manos antes de tocar al cachorro, siempre.
- Si vienes de una veterinaria, una plaza o una casa con perros: ropa a lavar y ducha antes del contacto.

5 Visitas con reglas, no sin visitas

Recibir gente es bueno para su socialización (ver módulo 06). Lo que hay que controlar es cómo entran:

- Zapatos afuera. Sin excepciones y sin sentir culpa por pedirlo.
- Manos lavadas antes de tocarlo.
- Si tienen perros en casa, que vengan con ropa recién cambiada.
- Nadie que haya estado con un perro enfermo en los últimos 30 días.

La clínica veterinaria es el lugar más peligroso al que puedes llevarlo

Esto sorprende a mucha gente, pero es así: la sala de espera de una veterinaria es el punto donde converge todo lo sano con todo lo enfermo. Los cachorros que llegan con diarrea y vómito —muchos de ellos con parvo sin diagnosticar todavía— pisan el mismo piso, se suben a la misma mesa y usan la misma pesa que tu cachorro.

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Durante toda la zona crítica, **que el veterinario venga a tu casa**. Es la forma más segura de completar el esquema de vacunas, y hoy en Chile casi todas las ciudades tienen servicio a domicilio. Es la diferencia entre exponerlo seis veces o ninguna.

SI EL VETERINARIO VA A TU CASA

1. Confirma que te visite **primero en su ruta del día**, antes de atender animales enfermos.
2. Pide **guantes nuevos y manos higienizadas frente a ti**.
3. Verifica la **cadena de frío**: la vacuna llega refrigerada entre 2 y 8 °C, con lote y fecha que se registran en la cartilla.
4. Prepara una **zona limpia**: una mesa lavable desinfectada previamente, con tu propia manta encima. Nadie entra con zapatos de calle a esa zona.
5. Desinfecta la superficie después de la visita.

SI NO QUEDA OTRA QUE IR A LA CLÍNICA

A veces no hay alternativa —una urgencia, un examen que necesita equipos. En ese caso el objetivo es entrar y salir **sin tocar absolutamente nada**:

1. **Agenda el primer turno del día**, cuando las superficies recién se desinfectaron.
2. **Espera en el auto** hasta que te llamen. No entres a la sala de espera, ni "un minuto".
3. Entra con el cachorro **en brazos o en jaula cerrada**. Sus patas no tocan el piso en ningún momento: ni en el estacionamiento, ni en el pasillo, ni en el box.
4. **Cero contacto con otros pacientes**. Si hay otro perro en el box o en el pasillo, esperas afuera hasta que se vaya. No dejes que nadie —ni otro cliente ni el personal— lo toque sin lavarse las manos o cambiarse los guantes frente a ti.
5. Lleva **tu propia manta** y ponla sobre la mesa de examen y sobre la pesa antes de apoyarlo. Sirve un tuto de bebé, un paño absorbente desechable o una toalla que después lavarás aparte.
6. Pide que **desinfecten frente a ti**.
7. **Al salir, antes de subir al auto**: desinfecta sus patas y tus zapatos con la botella de cloro que llevas (ver recuadro).
8. Al llegar: manta a lavar por separado, jaula desinfectada, ropa a lavar, manos lavadas antes de volver a tocarlo.

EL KIT QUE VA SIEMPRE EN EL AUTO

- **Botella con atomizador y cloro diluido 1:32** (1 taza de cloro al 5% en 8 litros de agua). Se prepara fresca el mismo día.
- **Segunda botella solo con agua limpia**, para enjuagar.
- Toalla limpia para secar.
- Manta exclusiva del cachorro.
- Paños absorbentes desechables.

Cómo usarlo al salir de la clínica: rocía con cloro las **suelas de tus zapatos**, la **base de la jaula** y las **ruedas** si tocaron el suelo. Para las **patas del cachorro**: rocía, deja actuar unos segundos, **enjuaga con agua limpia y seca bien**. El enjuague no es opcional —el cloro sin enjuagar irrita las almohadillas, y además él se las va a lamer.

Si prefieres algo más suave para las patas, sirven las **toallitas con clorhexidina**. Para el resto de las superficies, el cloro es lo que funciona.

7

Desparasitar en paralelo

Un cachorro con carga parasitaria alta tiene el intestino ya dañado, se deshidrata antes y responde peor si contrae parvo. La desparasitación interna no es un trámite: es parte del plan de prevención.

Esquema habitual: **cada 15 días desde las 2 semanas hasta los 3 meses**, luego **mensual hasta el año**, y después cada 3 meses de por vida. Tu veterinario ajusta según producto y hallazgos.

8

La pregunta filtro, antes de cada decisión

Cuando dudes si una actividad es segura, hazte una sola pregunta:

¿Esto implica pisar suelo público, tierra o pasto, tocar a un perro externo, o apoyarse en una superficie que no desinfecté yo?

Si la respuesta es sí, no se hace. Sin negociar, sin "es solo esta vez".

Resumen operativo

HACER SIEMPRE	NO HACER NUNCA
Mantenerlo en superficies interiores limpias y desinfectadas	Pasear por pasto, plazas, veredas o estacionamientos
Desinfectar a diario con cloro 1:32 o peroximonosulfato	Confiar en limpiadores multiuso, alcohol gel o amonio cuaternario
Completar el esquema hasta las 16 semanas o más	Sacarlo antes de 7 días después de la última dosis
Zapatos afuera y manos lavadas, todos, siempre	Permitir visitas o perros externos sin control
Socializarlo en casa, en brazos y en entornos controlados	Encerrarlo sin estímulos "hasta que esté vacunado"

04 Desinfección que realmente funciona

La mayoría de los productos de limpieza del supermercado **no inactivan el parvovirus**. Esta página vale por sí sola el resto del manual.

Qué sirve y qué no

PRODUCTO	¿SIRVE?	CÓMO USARLO
Cloro doméstico (hipoclorito de sodio 5%)	Sí	Diluir 1:32 — aprox. 1 taza de cloro en 8 litros de agua. Dejar actuar 10 minutos antes de enjuagar. Preparar la mezcla cada día.
Peroximonosulfato de potasio (Virkon® S y similares)	Sí	Según ficha técnica. Es la mejor opción para superficies que el cloro daña (metal, telas, jaulas).
Peróxido de hidrógeno acelerado (AHP)	Sí	Según ficha técnica. Menos corrosivo y con buen perfil de seguridad.
Amonio cuaternario	No	No inactiva virus sin envoltura. Muchos desinfectantes "para mascotas" son de este tipo.
Alcohol / alcohol gel	No	Inútil contra parvovirus. Sirve para tus manos junto con jabón, no para el piso.
Limpiadores multiuso, detergentes, pisos perfumados	No	Limpian suciedad, no desinfectan parvo.
Vapor, sol, vinagre, bicarbonato	No	Sin evidencia de inactivación confiable.

LOS DOS ERRORES QUE ANULAN LA DESINFECCIÓN

1. No limpiar antes.

La materia orgánica (heces, orina, barro, pelo) inactiva el cloro. Siempre: retirar la suciedad → lavar con agua y detergente → recién ahí desinfectar.

2. No respetar el tiempo de contacto.

Rociar y secar de inmediato no sirve. La superficie debe quedar visiblemente húmeda 10 minutos.

Qué desinfectar y con qué frecuencia

ZONA	FRECUENCIA	NOTA
Suelas de zapatos y umbral de entrada	Cada entrada	El punto más importante de todos
Piso donde vive el cachorro	Diaria	Ventilar bien después
Zona de baño / paños	Cada uso	Retirar deposiciones de inmediato
Jaula, cama, comedero y bebedero	Diaria	Usar Virkon® o AHP si el cloro daña el material
Juguetes	2 veces por semana	Preferir juguetes lavables, descartar los de tela porosa
Maleta del auto / jaula de transporte	Después de cada salida	Especialmente después de ir al veterinario
Ruedas del auto y coche	Semanal	Si estacionas donde pasan perros

SOBRE EL PASTO Y LA TIERRA

No existe forma práctica de desinfectar suelo natural. El virus puede permanecer viable **hasta un año o más** en tierra, y ni el cloro ni el sol lo resuelven. Por eso la regla no es "desinfectar el patio": es **no usar el patio de tierra o pasto** hasta que el esquema esté completo.

05 Calendario de vacunación

Una vacuna no protege. Dos tampoco. La inmunidad se consolida solo al completar el esquema, y el motivo tiene nombre: anticuerpos maternos.

Por qué se repite la vacuna

El cachorro recibe anticuerpos de su madre a través del calostro. Esos anticuerpos lo protegen al principio, pero **también bloquean la vacuna**. Van desapareciendo entre las 6 y las 16 semanas, en un momento distinto para cada cachorro y que no se puede predecir sin exámenes.

Existe entonces una **ventana de susceptibilidad**: unos días en que los anticuerpos maternos ya no alcanzan para proteger, pero todavía alcanzan para anular la vacuna. Repetir dosis cada 2 a 4 semanas es la forma de asegurarse de que al menos una dosis caiga después de que esa ventana se cerró.

El protocolo Rutherford Haus: seis dosis

Las guías internacionales fijan un **mínimo**: dosis cada 2 a 4 semanas hasta al menos las 16 semanas. Nosotros trabajamos con un esquema reforzado de **seis dosis**, porque en Rottweiler la ventana de susceptibilidad es más ancha y hemos visto demasiados casos de cachorros que se contagiaron "estando vacunados" con tres dosis.

Las dosis se aplican **cada 21 días (3 semanas)**, a partir de las 6 semanas de vida. Así, a las 10 semanas un cachorro lleva dos dosis, y la tercera le corresponde a las 12 semanas.

DOSIS	EDAD	VACUNA	OBJETIVO
1. ^a	6 semanas	Puppy DP (parvovirus + distemper)	Primera activación inmune, formulada para atravesar anticuerpos maternos altos
2. ^a	9 semanas	Polivalente (séxtuple)	Aislamiento total. Se mantienen todas las restricciones
3. ^a	12 semanas	Polivalente	Se mantienen todas las restricciones, sin excepción
4. ^a	15 semanas	Polivalente	Empieza a cerrarse la ventana de susceptibilidad en la mayoría de los cachorros
5. ^a	18 semanas	Polivalente	La primera que ya no puede ser bloqueada por los anticuerpos de la madre. No se puede omitir
6. ^a	21 semanas	Polivalente	Cierre del esquema del criadero. Cubre al cachorro que todavía tenía interferencia materna
Antirrábica	23 semanas	Antirrábica	Separada 2 semanas de la última polivalente. Obligatoria por ley en Chile; refuerzo cada año
Refuerzo	26 semanas (6 meses)	Revacunación núcleo	WSAVA 2024 adelantó este refuerzo, que antes se hacía al año
Después	Cada 3 años	Refuerzo núcleo	Las núcleo no son anuales. Sí lo son leptospirosis, tos de las perreras y antirrábica

CONVERSA ESTE ESQUEMA CON TU VETERINARIO

Seis dosis van **por sobre el mínimo** que exigen las guías internacionales, que se cumplirían con cuatro. Es una decisión de criadero, tomada por la vulnerabilidad conocida de esta raza y por la situación epidemiológica de nuestra zona. Muéstrale esta tabla a tu veterinario: puede ajustar intervalos o número de dosis según la marca de vacuna que use, el riesgo de tu comuna y cómo esté tu cachorro. **Lo que no es negociable es la dosis final después de las 16 semanas.**

OPCIÓN AVANZADA: SEROLOGÍA (TITULACIÓN DE ANTICUERPOS)

Cuatro semanas después de la dosis final se puede medir en sangre si el cachorro efectivamente **seroconvirtió**, es decir, si la vacuna funcionó. En un Rottweiler vale mucho la pena: es la única forma de saberlo con certeza en vez de asumirlo. Si el título es bajo, se revacuna.

La regla de los 7 días

No se sale a la calle, al pasto ni a espacios públicos hasta 7 días después de la última dosis del esquema.

En la práctica, con las seis dosis cada 21 días: no antes de las **22 semanas** de vida, una semana después de la sexta dosis. El sistema inmune necesita ese tiempo para montar la respuesta.

Cómo confirmar que la vacuna se aplicó bien

Una vacuna mal conservada o mal aplicada es una vacuna que no protege, y no vas a notarlo hasta que sea tarde. Verifica siempre:

- ☐ Jeringa nueva, abierta frente a ti
- ☐ Frasco o ampolla con nombre y lote visible
- ☐ Etiqueta del lote pegada en la cartilla
- ☐ Firma y timbre de la clínica o del profesional
- ☐ La vacuna llegó refrigerada, entre 2 y 8 °C — nunca tibia, nunca en una bolsa suelta
- ☐ Fecha registrada y fecha de la próxima dosis agendada antes de irte

Qué responder cuando alguien te presione

Vas a escuchar "pero mi perro está sano", "yo saqué a todos mis cachorros y nunca pasó nada", "un ratito no le hace mal". Ten una respuesta lista, corta y sin discusión:

**"Mi cachorro todavía no tiene el esquema completo.
No puedo exponerlo."**

No es una opinión y no admite debate. Nadie puede rebatir eso.

06 Socializar sin exponerlo

Existe un segundo error, opuesto al primero, y del que casi nadie advierte: aislar tanto al cachorro que llegue a adulto sin haber aprendido a vivir en el mundo.

TU CACHORRO NO PARTE DE CERO

En Rutherford Haus los cachorros **se socializan desde que nacen**. Crecen dentro de la casa, conviviendo con otros perros, con gatos y con niños. No salen de un canil aislado al fondo de un patio.

Eso significa que llega a tu casa con la parte más difícil ya hecha: sabe convivir, tolera el ruido y el movimiento, se deja manipular y se relaciona con otras especies sin miedo. **Tu trabajo es continuar esa base, no construirla** — y por eso la cuarentena sanitaria de estas semanas no lo va a convertir en un perro inseguro, siempre que sigas lo que viene a continuación.

La ventana de socialización de un perro se cierra aproximadamente a las **12 a 16 semanas**. Es exactamente el mismo período en que debe estar protegido del parvovirus. Ese es el verdadero desafío de esta etapa: **no hay que elegir entre las dos cosas, hay que hacer ambas bien**.

POR QUÉ ESTO IMPORTA TANTO EN UN ROTTWEILER

Un Rottweiler mal socializado se convierte en un adulto de 50 kilos reactivo, inseguro o difícil de manejar en la vía pública. En una raza clasificada como potencialmente peligrosa en Chile, eso no es un detalle de conducta: es un problema de seguridad, de convivencia y de responsabilidad legal para toda la vida del perro.

Las asociaciones de comportamiento veterinario son claras: los problemas conductuales derivados de la falta de socialización temprana terminan con más perros muertos que las enfermedades infecciosas. Ambos riesgos son reales y ambos se previenen.

Lo que sí puedes hacer durante la zona crítica

DENTRO DE CASA

- **Sonidos:** aspiradora, secador de pelo, timbre, bocinas, fuegos artificiales y llanto de bebé (hay grabaciones para esto). Empieza a volumen bajo, asociado a comida.
- **Superficies:** cerámica, alfombra, madera, plástico, una bandeja metálica, una manta arrugada, una tabla que se mueva un poco.
- **Manipulación:** revisar orejas, patas, boca y dientes, cortar una uña, cepillarlo, levantarlo. Todos los días, un minuto, siempre con premio.
- **Objetos raros:** paraguas que se abre, bolsas, cajas, escoba, bastón, silla de ruedas si es posible, casco o gorro.
- **Soledad:** ratos cortos y progresivos solo, para prevenir ansiedad por separación.

PERSONAS

- Invita gente a casa —con el protocolo de puerta del módulo 03— de forma escalonada: hombres con barba, personas mayores, niños tranquilos y supervisados, gente con uniforme.

- Que lo toquen desde arriba, que le den premios, que jueguen suave.
- Nunca forzar: si el cachorro se aleja, se respeta y se baja la intensidad.

FUERA DE CASA, SIN TOCAR EL SUELO

- **En brazos o en jaula**, paseos por la vereda para que vea autos, motos, bicicletas, gente y perros a distancia.
- **Viajes cortos en auto**, para que no asocie el auto solo con el veterinario.
- Sentarse contigo en la terraza de un café tranquilo, sobre tu manta, en un horario de poca gente.
- Visitas a casas de **amigos sin perros**, llevando su propia manta.

CON OTROS PERROS — LA ÚNICA FORMA SEGURA

- Perros **adultos, conocidos, con vacunas completas y al día**, que no frecuenten plazas ni guarderías.
- En un espacio interior limpio y desinfectado, o en la casa de ese perro si cumple lo anterior.
- Encuentros cortos y supervisados. Un perro adulto equilibrado le enseña más en 15 minutos que tú en una semana.

REGLA PRÁCTICA

La pregunta no es "¿lo saco o no lo saco?". Es "**¿cómo le muestro el mundo sin que toque el suelo?**". Casi siempre hay una versión segura de la experiencia que quieres darle.

07 Señales de alerta

El parvovirus avanza en horas. Un cachorro puede parecer normal en la mañana y estar crítico en la tarde. Detectarlo temprano es literalmente la diferencia.

Los 7 signos que debes memorizar

SIGNO		CÓMO SE VE	POR QUÉ IMPORTA
1	Decaimiento	Más quieto de lo normal, no quiere jugar, se esconde	Es el primer signo, y el más ignorado
2	Deja de comer	Rechaza comida de golpe, incluso premios que le encantan	Nunca es normal en un cachorro sano
3	Vómitos	Vomita espuma blanca o amarilla, o vomita el agua que bebe	Acelera brutalmente la deshidratación
4	Diarrea	Suelta, líquida, abundante	Pérdida masiva de líquidos y proteínas
5	Diarrea con sangre	Roja fresca o café oscuro, como borra de café	Alerta máxima. Urgencias ahora.
6	Dolor abdominal	Abdomen tenso, se queja al tocarlo, postura encorvada	Sugiere daño intestinal avanzado
7	Olor característico	Heces con olor dulzón-metálico muy penetrante	Muy sugerente de parvo

NO ESPERES LA SANGRE

Cuando aparece sangre en la diarrea, el cuadro ya está avanzado. Los signos 1, 2 y 3 juntos —decaído, sin comer y vomitando— ya son motivo suficiente para ir a urgencias. **No tienes más de 6 a 12 horas de margen.**

El test casero de 60 segundos

Si algo te hace dudar, haz estas cuatro comprobaciones. Toma un minuto y te dice mucho:

COMPRUEBA	CÓMO	SEÑAL DE ALARMA
Encías	Levanta el labio y mira el color	Pálidas, blancas, grisáceas o pegajosas al tacto → crítico
Relleno capilar	Presiona la encía con el dedo y suelta	Si tarda más de 2 segundos en volver al rosado → shock
Hidratación	Levanta la piel del lomo y suéltala	Si no vuelve de inmediato a su lugar → deshidratado
Agua	Ofrece un poco de agua	Si la vomita → no insistas, sal a urgencias

TEMPERATURA

Normal en un cachorro: **38,0 a 39,2 °C**. Con parvo puede haber fiebre al principio y luego **hipotermia** (bajo 37,5 °C), que es una señal mucho más grave que la fiebre. Un termómetro digital en el botiquín cuesta muy poco y sirve para tomar la decisión.

Diferenciarlo de una diarrea común

No toda diarrea es parvo. Un cambio de alimento, estrés por la mudanza o parásitos también la producen. La diferencia está en el conjunto:

DIARREA SIMPLE	SOSPECHA DE PARVO
Sigue comiendo y jugando	Decaído y sin apetito
Sin vómitos o alguno aislado	Vómitos repetidos, vomita el agua
Mejora en 24 h	Empeora hora a hora
Encías rosadas	Encías pálidas
Olor normal	Olor penetrante característico

Ante la duda, se asume lo peor y se consulta. Equivocarse por exceso de precaución no tiene ningún costo. Equivocarse por defecto sí.

08 Protocolo de emergencia

Si sospechas parvovirus, esto es lo que haces —en orden— desde el minuto cero.

Paso 1 • Lo que NO debes hacer

- **No le des comida ni premios.** El intestino no está tolerando alimento y forzarlo aumenta el daño.
- **No lo hidrates a la fuerza.** El agua a presión con jeringa puede irse al pulmón. Y el suero oral no reemplaza el suero intravenoso.
- **No le des medicamentos.** Ni humanos ni veterinarios sin indicación. Los antidiarreicos empeoran el cuadro al retener toxinas.
- **No lo bañes.** Le baja la temperatura corporal, que es justo lo que no puede permitirse.
- **No busques remedios caseros.** Ni arroz, ni té, ni yogur, ni suero casero. Solo pierdes horas.
- **No esperes a mañana.** Cada hora cuenta, literalmente.

Paso 2 • Los primeros 10 minutos

1. **Mantén la calma.** Necesitas pensar con claridad, no correr sin rumbo.
2. **Llama a una clínica con hospitalización 24 horas.** Pregunta textualmente: "**¿Tienen hospitalización para un cachorro con sospecha de parvovirus?**" Si dicen que no, cuelga y llama a la siguiente. No pierdas el viaje.
3. **Avísales que vas en camino** y a qué hora estimada llegas, para que preparen el box.
4. **Prepara el traslado:** manta limpia o paño absorbente, envuélvelo sin apretar, jaula de transporte si tienes.
5. **Lleva la cartilla de vacunas.** Es lo primero que te van a pedir.
6. **Escríbenos.** Queremos saberlo de inmediato, no después.

Paso 3 • Durante el traslado

- Alguien va con él atrás, no solo en la maleta.
- Mantenlo abrigado. Nada de ventanas abiertas encima; el enfriamiento empeora el shock.
- Conducción suave, sin frenazos.
- Si vomita: limpia la boca con un paño húmedo y sigue. No le ofrezcas agua.
- No lo bajes al suelo en el estacionamiento de la clínica. Entra con él en brazos.

Paso 4 • Cómo pedir la atención

Las palabras exactas importan, porque activan un protocolo distinto de triage. Di esto, en voz firme, apenas llegues:

**"Mi cachorro Rottweiler no tiene el esquema de vacunas completo,
está decaído, vomitando y con diarrea.
Necesito evaluación inmediata por sospecha de parvovirus."**

Y pide específicamente:

- ☐ Test rápido de parvovirus (inmunocromatográfico en heces)
- ☐ Hemograma para evaluar caída de glóbulos blancos
- ☐ Evaluación del grado de deshidratación y glicemia
- ☐ Fluidoterapia intravenosa, no subcutánea
- ☐ Antiemético para controlar el vómito y analgesia
- ☐ Aislamiento del paciente, por él y por los demás

LO QUE NO DEBES ACEPTAR

"Llévalo a la casa con suero oral y estos remedios, y si empeora lo traes."

La rehidratación de un cachorro con parvo debe ser intravenosa y monitorizada. Eso no se puede hacer en casa. Si te ofrecen manejo ambulatorio, pide traslado con ficha clínica a un centro con hospitalización. **Siempre tienes derecho a pedirlo.**

Paso 5 • Si no hay clínica 24 horas cerca

1. Veterinario a domicilio para evaluación inicial, colocación de vía (catéter) y primera carga de fluidos más antiemético.
2. Traslado al centro con hospitalización más cercano en cuanto sea posible, ya con vía puesta.
3. Mientras tanto: abrigado, en reposo, sin comida, sin agua forzada.

Resumen para la puerta del refrigerador

SI VES ESTO...	HACES ESTO YA	NO HACES ESTO
Vómitos repetidos	Llamar y salir a urgencias	No dar agua ni comida
Diarrea con sangre u olor fuerte	Traslado inmediato	No esperar a mañana
Deja de comer	Evaluación urgente	No tentarlo con premios
Decaimiento	Consulta el mismo día	No bañarlo, no medicarlo
Encías pálidas	Urgencia máxima	No perder tiempo en llamadas de opinión

**Dudar cuesta vidas.
Actuar a tiempo las salva.**

09 Qué esperar del tratamiento

Saber cómo es el proceso te ayuda a tomar mejores decisiones y a no rendirte en el día 2, que suele ser el peor.

En qué consiste realmente el tratamiento

No existe un medicamento que "mate" el parvovirus. El tratamiento es de soporte: se trata de mantener vivo al cachorro mientras su propio sistema inmune elimina el virus. Eso incluye:

- **Fluidoterapia intravenosa** con corrección de electrolitos y glucosa. Es el pilar.
- **Antieméticos** (maropitant, ondansetrón) para cortar el vómito.
- **Antibióticos de amplio espectro**, no contra el virus sino contra la sepsis bacteriana que provoca la ruptura de la barrera intestinal.
- **Analgesia**. El cuadro duele, y el dolor no controlado empeora el pronóstico.
- **Nutrición enteral temprana** por sonda cuando es posible: hoy se sabe que alimentar precozmente mejora los resultados frente al viejo "ayuno hasta que pare el vómito".
- **Monitoreo** de temperatura, glicemia, proteínas y signos vitales varias veces al día.

ANTICUERPOS MONOCLONALES

Desde 2023 existe en algunos mercados un anticuerpo monoclonal específico contra el parvovirus canino, que se administra precozmente y ha mostrado buenos resultados. Su disponibilidad en Chile es variable. Vale la pena **preguntar por él en la clínica**; si está disponible, se usa lo antes posible dentro del cuadro.

Cuánto dura y cómo evoluciona

MOMENTO	QUÉ SUELE PASAR
Días 1-2	El período más crítico. Suele empeorar antes de mejorar. Es esperable y no significa que el tratamiento falle.
Días 3-4	Punto de inflexión. Si el vómito cede y vuelve algo de interés por el entorno, el pronóstico mejora mucho.
Días 5-7	Recuperación del apetito, retiro progresivo de fluidos, alta con indicaciones.
Semanas 2-4	Convalecencia. Dieta blanda de alta digestibilidad, reposo, control de peso. Sigue eliminando virus: no debe tener contacto con otros perros.

Costos: hablemos claro

Una hospitalización por parvovirus en Chile suele significar entre 3 y 7 días internado. Los montos varían mucho según ciudad y clínica, pero es un gasto **significativo** y no planificado, que llega justo cuando ya invertiste en el cachorro.

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Contrata un **seguro veterinario desde el primer mes**, antes de que exista cualquier antecedente de salud, o mantén un fondo de emergencia equivalente a lo que costaría una semana de hospitalización. Es la decisión que más lamentan no haber tomado las familias que pasan por esto.

Después del alta

- Sigue eliminando virus en las heces por **2 a 4 semanas**. Cero contacto con otros perros.
- Tu casa queda contaminada: aplica el protocolo del módulo 10.
- Dieta gastrointestinal indicada por la clínica, en porciones pequeñas y frecuentes.
- Retomar el esquema de vacunación según indique el veterinario tratante.
- Un cachorro que superó parvo puede quedar con un intestino más sensible por meses. Es normal y se maneja con dieta.

10 Si hubo parvovirus en tu casa

Ya sea porque tu cachorro se enfermó, o porque vivió ahí un perro con parvo antes de que llegaras. El protocolo es el mismo.

Interiores

- 1. Retirar y **desechar** todo lo poroso que no se pueda desinfectar bien: camas de tela, juguetes de peluche, alfombras baratas, collares de tela.
- 2. Limpieza mecánica completa: aspirar, barrer, lavar con agua y detergente. Sin este paso, la desinfección no funciona.
- 3. Desinfectar con **cloro 1:32** o peroximonosulfato, dejando **10 minutos** de contacto. Repetir el ciclo completo **tres veces**, en días distintos.
- 4. Textiles lavables: lavar a **60 °C o más**, con cloro si el color lo permite, aparte del resto de la ropa.
- 5. Jaulas, comederos y bebederos: sumergir en solución desinfectante, no solo rociar.

Exteriores

El pasto y la tierra **no se pueden desinfectar**. El virus puede permanecer viable **hasta 12 meses o más**, especialmente en zonas con sombra y humedad.

Opciones reales: retirar las deposiciones a diario, mantener el área en desuso, o —si es viable— reemplazar la capa superficial de tierra o pavimentar el sector.

Cuándo puedes traer otro cachorro

ESCENARIO	RECOMENDACIÓN
Solo interiores afectados, desinfección completa hecha 3 veces	Esperar al menos 1 mes y que el nuevo cachorro llegue con esquema iniciado
Patio de tierra o pasto contaminado	Ese sector queda vedado 12 meses . El cachorro nuevo no accede hasta completar su esquema, y aun así con precaución
Quieres traerlo antes	Elige un cachorro mayor, con esquema completo y serología confirmada . No un cachorro de 8 semanas

UN ADULTO VACUNADO NO CORRE EL MISMO RIESGO

Un perro adulto con su esquema al día que ya vive en tu casa está bien protegido. Las restricciones de este módulo son para **cachorros nuevos**.

11 Anexos imprimibles

Anexo A • Ficha de vacunación

Completa esta tabla cada vez que lo vacunen y guárdala junto a la cartilla oficial.

FECHA	EDAD	VACUNA	LOTE	CLÍNICA / PROFESIONAL

Fecha de la última dosis: _____ · Puede salir a partir del: _____ (7 días después)

Anexo B • Hoja de emergencia

Imprime esta sección, complétala y pégala en el refrigerador **antes** de necesitarla.

Clínica 24 h más cercana

Teléfono

Dirección y tiempo estimado de viaje

Segunda clínica 24 h (respaldo)

Veterinario de cabecera

Veterinario a domicilio

Rutherford Haus

contacto@rutherfordhaus.cl

Anexo C • Botiquín mínimo

- ☐ Termómetro digital
- ☐ Suero fisiológico estéril
- ☐ Gasas estériles y vendas
- ☐ Guantes desechables
- ☐ Paños absorbentes desechables
- ☐ Manta exclusiva para traslados
- ☐ Jaula de transporte
- ☐ Cloro doméstico al 5% sin perfume
- ☐ Envase medidor para diluir 1:32
- ☐ Jabón neutro
- ☐ Cartilla de vacunas en un lugar fijo
- ☐ Bolsa lista con lo esencial para urgencias

Anexo D • Checklist para la visita al veterinario

- ☐ Turno agendado a primera hora del día
- ☐ Manta propia en la mochila
- ☐ Cartilla de vacunas
- ☐ Esperar en el auto hasta que llamen
- ☐ Entrar en brazos o en jaula, sin tocar el piso
- ☐ Manta sobre la mesa y sobre la pesa antes de apoyarlo
- ☐ Pedir desinfección y cambio de guantes frente a ti
- ☐ Verificar jeringa nueva, lote visible y cadena de frío
- ☐ Etiqueta del lote pegada, firma y timbre en la cartilla
- ☐ Agendar la próxima dosis antes de salir
- ☐ Al llegar: manta a lavar aparte, zapatos desinfectados, manos lavadas

Nota importante. Este manual reúne buenas prácticas de bioseguridad y las guías de vacunación vigentes al momento de su edición, y está escrito para orientar a las familias que reciben un cachorro de Rutherford Haus. **No reemplaza el diagnóstico ni las indicaciones de tu médico veterinario**, que es quien conoce a tu cachorro y la situación epidemiológica de tu zona. Ante cualquier signo de enfermedad, consulta siempre.



Rutherford Haus

Rottweilers de excelencia

www.rutherfordhaus.cl · contacto@rutherfordhaus.cl · [@rutherfordhaus](https://www.instagram.com/rutherfordhaus)

Manual de prevención del parvovirus · Edición 2026